

MUCOCELE EN MUCOSA LABIAL INFERIOR

MUCOCELE IN LOWER LABIAL MUCOSA

Ana I. Quintero B.¹, Mónica D. Arellano H.¹, Ana E. Sánchez B.¹.

aelizabethsanchezb.ucg@gmail.com

Palabras clave. Mucosa labial, mucocele, glándula salival menor.

Introducción. El mucocele es una lesión frecuente de a cavidad bucal. Ocurre debido a la ruptura o por el bloqueo del conducto de la glándula salival menor [1]. Por trauma como mordeduras, microtraumas o por complicación de alguna intervención. Puede aparecer en cualquier área de la boca donde asienten estas glándulas. El sitio más afectado es la mucosa labial inferior, seguido por lengua, piso de la boca y mucosa bucal [2]. Existen dos tipos de mucocele: de extravasación y de retención. Clínicamente se caracterizan por nódulos, blandos o fluctuantes, que van desde el color normal de la mucosa oral hasta el azul violáceo. Afecta a cualquier edad y se presenta igualmente en ambos sexos con mayor incidencia en la segunda década de vida [3]. El tratamiento es quirúrgico. El objetivo general del trabajo es describir las características clínicas del mucocele [4].

Reporte de caso. Paciente masculino de 19 años que acude a consulta por presentar una lesión en mucosa labial de 15 días de evolución y asintomática. A la exploración intrabucal se observa una pápula del mismo color de la mucosa adyacente, de 5 mm aproximadamente, en mucosa labial inferior en zona de canino derecho.

Discusión. El mucocele, es una patología benigna que se relaciona con el traumatismo o succión labial, está en el odontólogo identificar el factor traumático y controlar el hábito. La ubicación por excelencia del mucocele es el labio inferior. En el momento de la escisión quirúrgica es necesaria la eliminación total de la lesión para evitar la recidiva y se debe eliminar el resto de las glándulas circundantes al mucocele.

Conclusiones. Esta lesión es de las más comunes en la cavidad oral, no son lesiones malignas pero suelen tener recidiva, por lo cual es importante extirpar por completo. Es fácil identificar un mucocele por su localización y su aspecto clínico.

Referencias.

1. Senthilkumar B., Nazargi M. (2012) Mucocele: An unusual presentation of the minor salivary gland lesion. *J Pharm Bioallied Sci.* **4**(2): S180–S182.
2. Chaitanya P., Praveen D., Reddy M. (2017) Mucocele on lower lip: a case series. *Indian Dermatol Online J.* **8**(3): 205-207.
3. Chandramani M., Khushubu B., Saurabh V., Mansi T. (2014) Oral mucocele: A clinical and histopathological study. *J Oral Maxillofac Pathol.* **18**(1): S72–S77.
4. Nallasivam K., Sudha B. (2015) Oral mucocele: Review of literature and a case report. *J Pharm Bioallied Sci.* **7**(2): S731–S733.



Imagen 1. Pápula asintomática, localizada en mucosa labial inferior del lado izquierdo. del color de la mucosa.